



Il/La Sig/ra			
deve presentarsi il giorno		alle ore	per essere sottoposto/a a colonscopia.

La corretta preparazione all'esame è condizione indispensabile per ottenere risultati di qualità: indagine più veloce, sicura e affidabile.

Le chiediamo quindi di attenersi alle indicazioni di seguito riportate.

La PREPARAZIONE INTESTINALE all'esame per TUTTI i pazienti

SUGGERIMENTI DIETETICI

• TRE GIORNI PRIMA DELL'ESAME

- Assumere dieta povera di fibre: si consiglia EVITARE: frutta con buccia o contenente semi, frutta secca, verdura, comprese zuppe di verdura, insalata, riso, legumi e cibi integrali.
- Adeguata idratazione con acqua o liquidi chiari (thè, tisane, camomilla)
- Evitare succhi contenenti polpa.

• IL GIORNO PRIMA DELL'ESAME

- **Colazione:** può assumere thè o camomilla con qualche biscotto
- **Pranzo:** dieta leggera: brodo, una porzione di carne magra; può bere liquidi chiari (thè, tisane, camomilla), latte magro.
- Evitare succhi che contengono polpa
- Evitare di alimentarsi dopo aver iniziato la preparazione

• IL GIORNO DELL'ESAME

- Deve presentarsi digiuno (si può assumere acqua fino a due ore prima dell'esame)

La pulizia INTESTINALE all'esame per i pazienti di età superiore ai 18 anni

PLENVUE: La confezione contiene, dose 1 (busta singola) e dose 2 (buste A e B)

PREPARAZIONE E MODALITA' DI ASSUNZIONE

- **Dose 1** (busta singola) deve essere sciolta in ½ litro di acqua da bere in 30'. Assumere poi almeno ½ litro di liquidi "chiari" (acqua, thè, camomilla, tisana, ecc) in 30'. Consigliato bere ulteriori liquidi "chiari".
- **Dose 2** (busta A e busta B), DA NON UTILIZZARE

ORARIO DI ASSUNZIONE DELLE DOSI

La prima dose (busta singola) andrà assunta alle ore 19.30 del giorno precedente l'esame.

RACCOMANDAZIONI ED ULTERIORI INFORMAZIONI

- Se è affetto da FENILCHETONURIA o da FAVISMO, NON esegua la preparazione con i prodotti consigliati e contatti il servizio di Radiologia.
- Se è in gravidanza contatti la struttura dove deve essere eseguita l'esame e parlare con il medico.
- Se sta assumendo farmaci anticoagulanti (Sintrom, Coumadin, Eliquis, Pradaxa, Xarelto, Lixiana, Eparina, ecc) o antiaggreganti (Aspirina, Clopidogrel, Ticlopidina, Brilique, Efient, ecc), contatti il centro TAO per gli anticoagulanti ed il servizio di endoscopia o il suo medico di medicina generale almeno 7 gg prima dell'esame per le opportune indicazioni.
- Prima di accedere alla Radiologia passare dal CUP (Centro Unico di Prenotazione) per le opportune procedure (Registrazione e pagamento del Ticket se dovuto).
- Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al Servizio di Radiologia.